

Gabriel Cubillos

LÁSER DE BAJA POTENCIA SUBDERMICO

para Tratamiento Quirúrgico
de Obesidad: Serie de casos

Autor: Gabriel Cubillos

Mesa de Investigación

*Gabriel Fernando Cubillos Valencia / Médico Cirujano
Andrés Miguel Ortega Pulido / Cirujano Plástico
José Daniel Toledo Arenas / Médico Epidemiólogo*

Base quirúrgica: Liposucción

Uso de Laser baja Potencia Aprobado por: FDA

Seguridad del Procedimiento : Alta

Serie de casos (n= 54), de LBPS en sujetos obesos

IMC > 30 Kg/m²

Análisis estadístico con R. Resultados:

Datos basales: Promedio Peso: 97,8 Kg. (IMC:35,6) Peso a 2 meses: 82,2 kg (IMC 29,9)

Peso a 12 meses 79,6 kg (28,9 IMC).

No se presentaron complicaciones ni eventos adversos moderados o severos.

No es un procedimiento curativo y requiere de otras medidas de mantenimiento a largo plazo

Conclusiones: Los pacientes sometidos a procedimiento quirúrgico con láser frío de baja potencia para diluir y retirar por succión la grasa corporal, no presentaron complicaciones, siendo un procedimiento efectivo para retirar grasa líquida corporal como apoyo al tratamiento para bajar de peso y mejorar las condiciones de salud en personas con obesidad o sobrepeso.

Su recuperación fue inmediata, pudiendo caminar y valerse por sus propios medios, una hora después de su recuperación quirúrgica en sala. Logrando bajar de peso sustancialmente

Mas información : email: servicioalcliente@doctorcubillos.com

No es un procedimiento curativo y requiere de otras medidas de mantenimiento a largo plazo.

No se presentaron complicaciones intraoperatorias en el postoperatorio inmediato

(primera semana), posteriormente ocurrieron 2 casos de rash cutáneo (3,7%), que no requirieron hospitalización ni tratamientos diferentes a tópicos con mejoría total, no se presentaron recidivas, otros cuadros clínicos presentados en los primeros 3 meses fueron gripe (14,8%) que fueron tratados con medidas sintomáticas.